

Kontraindikácie laseroterapie (MLS Laser):

Absolútne:

- Epilepsia
- Onkologické ochorenia
- Aplikácia na oblasť brucha, krížov tehotných žien
- Aplikácia na oblasť štítnej žľazy a reprodukčných orgánov (vaječníky a semenníky)
- Aktívne krvácanie
- Horúčka
- Priama aplikácia na oblasť kardiostimulátora
- Pacienti užívajúci drogy a steroidy

Relatívne:

- Zásadné Systémové ochorenia (Systémový lupus erythematosus)
- Fotosenzitivita, lieky ovplyvňujúce citlivosť na svetlo
- Tetovanie a pigmentácia v blízkosti oblasti liečenej plochy
- Kortikosteroidy alebo injekcie v ošetrovanej oblasti v období posledných 3 mesiacov
- Aplikácia od 4 do 6 mesiacov po rádioterapii
- Hlboká žilná trombóza
- Aplikácia v periorbitálnej oblasti
- Deti do 10 rokov

Kontraindikácie diatermie:

- Kardiostimulátor
- Priama aplikácia na kovové implantáty,
- Onkologické ochorenia , akýkoľvek typ malignity
- Akútne zápaly
- Krvácavé stavy , tromboflebitída
- Neodporúča sa aplikovať na rastové zóny

Kontraindikácie magnetoterapie:

- Ochorenia krvi
- Krvácavé stavy
- Infekčné a mykotické, hubové ochorenia
- Hypotenzia – nízky tlak
- Akútna tuberkulóza
- Onkologické ochorenia , po liečbe chemoterapiou
- Neznáma bolesť v okolí brucha
- Epilepsia
- Tehotenstvo